

<p>-پزشک ممکن است داروهای ضد و ویروسی را برای بیمار تجویز کند که این داروها طول مدت بیماری را کاهش و از پیامدهای جدی پیشگیری میکنند. لذا دوره درمان را طبق دستور پزشک کامل کنید .</p> <p>-عوارض جانبی این داروها ممکن است شامل تهوع و استفراغ باشد، در صورتی که این داروها را با غذا مصرف کنید، کمتر دچار این عوارض خواهید شد . داروهای ضد ویروسی بعد از غذا مصرف شود و همچنین به صورت کم کم داده شود و در صورت استفراغ کودک تا نیم ساعت پس از مصرف دارو ، مجددا باید مصرف دارو تکرار شود .</p>	<p>مراقبت های پزشکی و پرستاری در منزل</p>
<p>- در صورت مشاهده موارد زیر سریعاً به بیمارستان و یا پزشک مراجعه کنید:</p> <ul style="list-style-type: none"> - تب بالای ۳۸ درجه که بیش از ۳ روز طول بکشد - استفراغ مکرر - اسهال شدید - درد قفسه سینه - اختلال در راه رفتن - تشنج - مشکلات تنفسی یا سرفه شدید (تنفس شدید و سیاه شدن لب ها و یا اندامها) - بی حالی شدید یا خواب آلودگی مفرط و یا هذیان گویی 	<p>پیگیری های پس از ترخیص و مکان و زمان مراجعه به پزشک</p>
<p>برای پیگیری جواب آزمایشات و یا نتایج پاراکلینیک در زمان مقرر به واحد آزمایشگاه و یا پاتولوژی مراجعه نمایید</p>	<p>اعلام نتایج تستهای پاراکلینیک بیمار</p>
<p>جهت دسترسی به همه مطالب آموزشی در سایت بیمارستان ، QR code روبرو را اسکن نمایید</p> 	