

<p>- ناف معمولا ظرف ۵-۱۴ روز خشک شده و می افتد و جای آن بصورت زخمی باقی می ماند که ظرف چند روز خوب می شود</p> <p>مهمترین مسئله در نگهداری بندناف قبل از افتادن آن، جلوگیری از عفونت است. استفاده از دارو یا هر گونه مواد دیگر مانند الکل به دور بند ناف ممنوع است .</p> <p>- بندناف را باید خشک و تمیز نگه داشت .</p> <p>-در هنگام تعویض پوشک لبه بالای آن باید زیر بندناف تا کرد تا بندناف در معرض هوا قرار داشته باشد و با ادرار تماس پیدا نکند .</p>	<p>مراقبت های پزشکی و پرستاری در منزل</p>
<p>۱-در صورت داشتن موارد زیر به بیمارستان مراجعه نمایید</p> <p>-خوب شیر نخوردن ، مکیدن ضعیف و بیحالی</p> <p>- بد حال شدن ، تب دار شدن ، تنفس مشکل یا تند و ناله دار ، کبودی لب و دهان ، بی قراری غیر معمول</p> <p>- اسهال ، استفراغ ، تشنج</p> <p>- التهاب و قرمزی بند ناف ، داشتن ترشح چرکی ،، قرمزی و ورم ناف و دیواره شکم و دیر افتادن ناف</p> <p>۳- در صورت دیدن ترشحات زرد رنگ و چسبنده در چشم طوری که پلکها باز نمیشوند احتمال عفونت چشم نوزاد مطرح است که با نظر پزشک باید تحت درمان دارویی قرار گیرد.</p> <p>- مراجعه به پزشک ۲۴-۴۸ ساعت پس از ترخیص و یا</p> <p>- مراجعه به شنوایی سنجی</p>	<p>پیگیری های پس از ترخیص و مکان و زمان مراجعه به پزشک</p>
<p>برای پیگیری جواب آزمایشات و یا نتایج پاراکلینیک در زمان مقرر به واحد آزمایشگاه نمایید.</p>	<p>اطلاع رسانی و اعلام نتایج تستهای پاراکلینیک بیمار</p>
<p>جهت دسترسی به همه مطالب آموزشی در سایت بیمارستان ، QR code روبرو را اسکن نمایید .</p>	