

<p>- داروهای ضد مالاریا : پریماکین ، کلروکین و سایر دارو های ضد مالاریا با دوز بالا</p> <p>- سولفونامیدها: کوتریموکسازول، سولفانیلامید، سولفی سوکسازول، سولفادiazین، سولفاستامید، سولفاپریدین</p> <p>- بعضی انواع مسکن ها : آسپرین</p> <p>- بعضی از انواع آنتی بیوتیک ها : نالیدیکسیک اسید، نیتروفورانتوئین ، داپسون، فورازولیدون ، کلرامفنیکل ، سیپروفلوکساسین نیتروفورازون</p> <p>متفرقه: نفتالین، بنزن، ایبوپروفن، دیمرکاپرول، دوکسوروبیسین، پروبنسید، منادیول سدیم سولفات (ویتامین کا ۴)،</p> <p>مپاکرین منادیول (ویتامین کا ۳)، پارا آمینو سالیسیلیک اسید، مپاکرین فنازوپریدین - داروهای کم اثر: آسکوربیک اسید، کلشی سین، دوپامین، ایزونیازید، ویتامین کا ۱، پروکائین آمید، استریتومایسین، سولفادiazین، پروکائین آمید، پریمتامین، کینیدین کینین، استریتومایسین، سولفادiazین، تری هگزی فنیدیل، آنتازولین</p>	<p>- داروهای منع مصرف در فاویسم:</p>
<p>- در صورت مشاهده موارد زیر سریعاً به بیمارستان و یا پزشک مراجعه کنید:</p> <p>در صورت بروز علائم فاویسم و بروز تب او را به مرکز درمانی ببرید.</p>	<p>پیگیری های پس از ترخیص و مکان و زمان مراجعه به پزشک</p>
<p>برای پیگیری جواب آزمایشات و یا نتایج پاراکلینیک در زمان مقرر به واحد آزمایشگاه و یا پانولوژی مراجعه نمایید</p>	<p>اعلام نتایج تستهای پاراکلینیک بیمار</p>
<p>جهت دسترسی به همه مطالب آموزشی در سایت بیمارستان ، QR code روبرو را اسکن نمایید</p>	